

FICHA TÉCNICA CHEMITEC

BEROSEG® SOLUÇÃO INJETÁVEL A 7%

Tratamento da Babesiose Bovina e Equina/Equídea. Combate a “Tristeza Bovina” e o “Mal das Cadeiras”.

Uso Veterinário



✓ FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:
Diminazeno (Diaceturato).....7,0 g
Veículo q.s.p.100,0 ml

ATENÇÃO: Obedecer aos seguintes períodos de carência:
BOVINOS: ABATE - O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 34 dias após a última aplicação.
LEITE – Este produto dos animais tratados com este produto não deve ser destinado ao consumo humano até 21 dias após a última aplicação.
EQUINOS: ABATE – Este produto não deve ser aplicado em equinos destinados ao consumo humano.
A utilização do produto em condições diferentes das indicadas nesta bula pode causar a presença de resíduos acima dos limites aprovados, tornando o alimento de origem animal impróprio para o consumo.

✓ PROPRIEDADES:

Beroseg® Solução Injetável a 7% apresenta ação antipirética e ação do diaceturato de diminazeno que é eficaz no combate à *Babesia bigemina*, *Babesia bovis*, *Babesia equi*, *Babesia caballi*, agentes causadores da Babesiose (Piroplasmose)

✓ INDICAÇÕES:

Beroseg® Solução Injetável a 7% é indicado para bovinos e equinos no tratamento da Babesiose.

BABESIOSE:

- **Bovinos** (*Babesia bigemina*, *Babesia bovis*),
- **Equinos** (*Babesia equi*, *Babesia caballi*).

✓ POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Administrar por via intramuscular.

1. Bovinos: a dose recomendada é de 3,5 mg/kg de diminazeno, equivalente a 1 mL de Beroseg® Solução Injetável a 7% para cada 20 kg de peso corporal.

2. Equinos: a dose recomendada é de 5,0 mg/kg de diminazeno, equivalente a 1,5 mL de Beroseg® Solução Injetável a 7% para cada 20 kg de peso corporal. Geralmente uma só aplicação é suficiente para o tratamento da Babesiose, porém, na persistência dos sintomas uma segunda aplicação pode ser administrada de 48 a 72 horas após a primeira, de acordo com orientação do Médico Veterinário.

Tratamento da Babesiose Bovina (3,5 mg/kg)	
Peso do animal (kg)	Volume de Beroseg 7%
25	1,25 mL
50	2,5 mL
100	5 mL
200	10 mL
300	15 mL
400	20 mL
500	25 mL
600	30 mL

Tratamento da Babesiose Equinos/Equídeos (5 mg/kg)

Peso do animal (kg)	Volume de Beroseg 7%
50	3,75 mL
100	7,5 mL
150	11,25 mL
200	15 mL
250	18,75 mL
300	22,5 mL
350	26,25 mL
400	30 mL

✓ EFEITOS COLATERAIS:

O diminazeno é bem tolerado na dose indicada, porém, raramente, os animais poderão apresentar tremor muscular, salivação, queda da pressão sanguínea e pulso acelerado. Nesses casos, suspender imediatamente as aplicações; o tratamento sintomático deve ser de acordo com o atendimento do Médico Veterinário.

✓ PRECAUÇÕES DE USO:

- Doses volumosas deverão ser divididas, não ultrapassando 10 mL por ponto de aplicação.
- O produto não apresenta efeitos colaterais nas doses recomendadas.
- Os casos de hipersensibilidade ao diminazeno são raros e transitórios, desaparecendo com a suspensão do tratamento.

✓ APRESENTAÇÃO:

Frasco-ampola contendo 30 mL de Beroseg® Solução Injetável a 7%.

✓ CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C) e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no M. A. sob o nº SP 000165-0.000030 em 24/01/2025.

Vencimento: 2 (dois) anos após a data da fabricação.
Após aberto, utilizar o produto no prazo máximo de 90 dias.

Proprietário: **CHEMITEC AGRO- VETERINÁRIA LTDA.**
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP.
Res. Técnico: Carlos H. A. Baptista - CRF/SP 30.191.